

Bovinos — guia prático para reconhecer doenças

33

Doenças	Principais sintomas	Profilaxia
Febre aftosa "Fetosa" "Aftosa"	- Febre - Aftas na boca, língua e úbere. - Baba espessa - Erupções (feridas) nas patas.	- Vacinação com vacina oleosa polivalente; animais adultos 01 dose por ano e animais até 02 anos 02 doses por ano. - Isolar animais doentes.
Brucelose "Aborto infeccioso" "Aborto contagioso"	- Baixa Fertilidade ou esterilidade - Aborto - Retenção de placenta - Metrite (infecção do útero)	- Só comprar fêmeas adultas vacinadas ou com atestado negativo da doença e reprodutores com atestado negativo. - Fazer exame das fêmeas e reprodutores em serviço. - Vacinar as fêmeas entre 3 e 8 meses de idade. - Eliminar do plantel os animais portadores da doença (abate).
Carbúnculo Sintomático "Manqueira" "Mal de ano" "Mal de quarto" "Peste de mancar"	- Febre - Inchação dos quartos - Manqueira - Tristeza - Falta de apetite	- Vacinar os animais aos 3-4 meses, repetindo a dose aos 12 meses. Em lugares em que a doença é comum, repetir a vacinação aos 18 meses.
Carbúnculo hemático "Baceira" "Antraz" "Carbúnculo" "Verdadeiro"	- Febre - Cólicas - Sangramento pelo ânus, boca e narinas	- Vacinação dos animais 1 vez por ano, só quando for confirmado surto da doença. - Enterrar ou queimar animais mortos.
Raiva "Loucura" "Hidrofobia"	- Descoordenação nervosa - Pupilas dilatadas - Parada da ruminiação - Para de se alimentar e beber - Baba intensa	- Vacinação dos animais 1 vez por ano, apenas onde a doença ocorre com frequência ou quando há surto da doença na região. - Isolar animais doentes.
Botulismo	- Perversão do apetite - Andar rígido e cambaleante - Paralisia dos membros traseiros e em seguida dos membros dianteiros - Dificuldade de mastigação - Prostração	- Fornecer mistura mineral rica em fósforo e cálcio ou farinha de osso diariamente. - Não deixar restos de animais (e principalmente ossos) nos pastos. - Vacinar os animais quando houver surto da doença. - Enterrar ou queimar animais mortos.
Anaplasmose e piroplasmose "Tristeza" "Febre do carrapato"	- Febre - Tristeza - Pelos arrepiados - Anemia - Urina avermelhada (somente quando é piroplasmose).	- Fazer premunição em animais importados. - Combater os carraptos sempre que houver necessidade.
Tuberculose "Magreza"	- Emagrecimento - Tosse - Gânglios inchados	- Só colocar no rebanho animais com atestado negativo da doença. - Fazer exame em todo o rebanho (tuberculina). - Eliminar animais portadores da doença.
Paratífo "Pneumoenterite" "Curso"	- Febre - Diarréia fétida, cinzenta - Falta de apetite - Emagrecimento rápido	- Manter bezerreiros limpos e secos. - Separar os bezerros mais velhos dos mais novos. - Isolar animais com diarréia. - Vacinar vacas prenhas (8º mês). - Vacinar bezerros aos 15 e 30 dias de vida.
Verminoses	- Ventre aumentado - Diarréia escura - Pelos arrepiados - Emagrecimento - Atraso no crescimento	- Nos bezerreiros, separar os mais velhos dos mais novos. - Manter instalações limpas. - Ter pastos próprios para bezerros em locais livre de unidade (evitar as baixadas). - Vermifugar todos os animais do rebanho pelo menos, no início e no fim da estação chuvosa.
Mastite "Mamite" "Inflação do peito"	- Úbere avermelhado, inchado - Diminuição da produção de leite - Endurecimento da úbere. - Aparecimento de grumos (pequenos coágulos no leite)	- Higiene de ordenha: <ul style="list-style-type: none">lavagem e desinfecção das mãos do ordenhador.lavagem e desinfecção do Úbere.uso de caneca têlada.ordenhar primeiros vacas sadias e por último aquelas que tiverem ou têm problemas.desinfecção do úbere depois da ordenha.