

Médico adverte sobre exagero

O diretor médico da Merrell Lepetit, Sérgio Rosengarten, admitiu que a ingestão de grande quantidade do Cepacol pode acarretar graves efeitos colaterais. Segundo ele, beber o antisséptico bucal traz sérias consequências não só para crianças, mas também para adultos.

Os efeitos colaterais são provocados pelo álcool existente no Cepacol (17%) e pelo flúor. "Por essa razão, recomendamos que o produto seja consumido apenas por crianças maiores de seis anos, que já sabem fazer bochechos." O diretor disse que esse aviso consta no produto de higiene bucal com flúor. No entanto, nos frascos em que não há flúor, não há qualquer alerta.

Segundo Rosengarten, a ingestão de meio frasco de Cepacol é considerada como intoxicação aguda. "Mas não há como mensurar os riscos conforme a quantidade, que dependem da idade e do peso da criança", completou.

O diretor da Merrell Lepetit garantiu que os riscos do consumo acidental do remédio são menores no Brasil. O líquido é vendido aqui em embalagens de 200 mililitros. "Nos Estados Unidos, os frascos contêm 500 e 750 mililitros", afirmou. O diretor lembrou, ainda, que o Cepacol brasileiro não apresenta sabor tão agradável quanto o vendido nos Estados Unidos. "As crianças não ficam tão estimuladas a beber o líquido de higienização."